

# Solutions pour la lutte aux maladies des légumes-feuilles

| Nom de la maladie                 |                                                   |                                                        |                     |               |                                                 |                        |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Commun                            | Scientifique                                      | Produit                                                | Groupe de fongicide | DAAR* (jours) | DS <sup>†</sup>                                 | Résistance au délavage | Dose (kg ou L/ha) |
| Pourriture grise                  | <i>Botrytis cinerea</i>                           | Cantus <sup>MD</sup> (laitue seulement)                | 7                   | 14            | 12 h                                            | 1 h                    | 0,285             |
| Mildiou                           | <i>Peronospora farinosa f.sp. spinaciae</i>       | Pristine <sup>MD</sup> (répression, épinard seulement) | 7 et 11             | 0             | 12 h (récolte / éclaircissage manuel : 9 jours) | 1 h                    | 1,6               |
|                                   | <i>Bremia lactucae</i><br><i>Peronospora</i> spp. | Zampro <sup>MD</sup>                                   | 40 et 45            | 0             | 12 h (récolte manuelle : 1 jour)                | 2 h                    | 1,0               |
| Cercosporose                      | <i>Cercospora apii</i>                            | Pristine (répression, céleri seulement)                | 7 et 11             | 0             | 12 h (récolte / éclaircissage manuel : 9 jours) | 1 h                    | 1,0               |
| Septoriose                        | <i>Septoria apiicola</i>                          | Pristine (répression, céleri seulement)                | 7 et 11             | 0             | 12 h (récolte / éclaircissage manuel : 9 jours) | 1 h                    | 1,0               |
| Sclérotiniose mineure             | <i>Sclerotinia minor</i>                          | Cantus (répression, laitue seulement)                  | 7                   | 14            | 12 h                                            | 1 h                    | 0,385             |
| Sclérotiniose, pourriture blanche | <i>Sclerotinia</i> spp.                           | Pristine (répression)                                  | 7 et 11             | 0             | 12 h (récolte / éclaircissage manuel : 9 jours) | 1 h                    | 1,0 – 1,3         |

\*Pristine peut être appliqué dans le cardon, le céleri, le céleri chinois, le fenouil de Florence, la laitue, la rhubarbe, l'épinard et la bette à carde seulement.

# Solutions pour la lutte aux mauvaises herbes dans les légumes-feuilles

| Mauvaise herbe      |                          |                           |                    |               |                 |                        |                   |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Type                | Nom commun               | Produit                   | Groupe d'herbicide | DAAR* (jours) | DS <sup>†</sup> | Résistance au délavage | Dose (kg ou L/ha) |
| Graminées annuelles | échinochloa pied-de-coq  | Poast <sup>MD</sup> Ultra | 1                  | 15 – 30       | 12 h            | 1 h                    | 0,32 – 0,47       |
|                     | digitaire sanguine       |                           |                    |               |                 |                        |                   |
|                     | panic d'automne          |                           |                    |               |                 |                        |                   |
|                     | sétaire (verte, glauque) |                           |                    |               |                 |                        |                   |
|                     | panic capillaire         |                           |                    |               |                 |                        |                   |
|                     | ivraie de Perse          |                           |                    |               |                 |                        |                   |
|                     | panic millet             |                           |                    |               |                 |                        |                   |
|                     | maïs spontané            |                           |                    |               |                 |                        |                   |
| graminées vivaces   | chiendent                | Poast Ultra               | 1                  | 15 – 30       | 12 h            | 1 h                    | 0,47 – 1,1        |

\*DAAR = Délai d'attente avant la récolte (jours)    †DS = Délai de sécurité après traitement