


Solutions pour les fruits à pépins

Les diagrammes représentant les stades de croissance sont inclus aux fins de référence rapide seulement. Veuillez consulter les pages portant sur chaque produit et les étiquettes des produits pour obtenir des renseignements détaillés sur les stades de croissance.



¹ Les zones plus foncées indiquent les périodes de traitement recommandées pour le régulateur de croissance des plantes Apogee[®].

² Les zones plus foncées indiquent les périodes de traitement recommandées pour le fongicide Pristine[®].

¹ Dans la mesure du possible, alterner les fongicides du groupe M avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes agents pathogènes.

² Dans la mesure du possible, alterner les fongicides du groupe M² avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes agents pathogènes.

³ Ne pas appliquer plus de deux fois au cours d'une même saison de croissance. Utiliser en alternance avec des acaricides offrant des modes d'action différents pour s'assurer que chaque génération n'est exposée qu'une seule fois à Nealta[®].

⁴ Ne pas faire plus de deux traitements consécutifs avant d'alterner avec un fongicide offrant un mode d'action différent et n'appartenant pas aux groupes 7 ou 11.

⁵ Ne pas faire plus de deux traitements consécutifs avant d'alterner avec un fongicide offrant un mode d'action différent et supprimant les mêmes pathogènes.

⁶ Ne pas faire plus de quatre applications, au total, par saison. BASF recommande de ne pas faire plus de deux traitements consécutifs avant d'alterner avec un fongicide efficace, offrant un mode d'action différent et n'appartenant pas à la classe des strobilurines.