


# Solutions pour les raisins

Les diagrammes représentant les stades de croissance sont inclus aux fins de référence rapide seulement. Veuillez consulter les pages portant sur chaque produit et les étiquettes des produits pour obtenir des renseignements détaillés sur les stades de croissance.



Les zones plus foncées indiquent les périodes de traitement recommandées pour le fongicide Pristine<sup>40</sup>.

Les zones plus foncées indiquent les périodes de traitement recommandées pour les fongicides Forum<sup>40</sup>, Polyram<sup>40</sup> DF, Sovran<sup>40</sup>, Vivando<sup>40</sup> et Zampro<sup>40</sup>.

Les zones plus foncées indiquent les périodes de traitement recommandées pour l'acaricide Nealta<sup>40</sup>.

<sup>4</sup> Ne pas faire plus de quatre applications, au total, par saison. BASF recommande de ne pas faire plus de deux traitements consécutifs avant d'alterner avec un fongicide efficace, offrant un mode d'action différent et n'appartenant pas à la classe des strobilurines.

<sup>5a</sup> Ne pas faire plus de deux traitements consécutifs avant d'alterner avec un fongicide homologué offrant un mode d'action différent.

<sup>1</sup> Dans la mesure du possible, alterner les fongicides du groupe M avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes agents pathogènes.

<sup>2</sup> Ne pas appliquer plus de deux fois au cours d'une même saison de croissance. Utiliser en alternance avec des acaricides offrant des modes d'action différents pour s'assurer que chaque génération n'est exposée qu'une seule fois à Nealta.

<sup>3</sup> Dans la mesure du possible, alterner les fongicides du groupe M<sup>F</sup> avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes agents pathogènes.

<sup>7</sup> Ne pas faire plus de deux traitements consécutifs avant d'alterner avec un fongicide offrant un mode d'action différent et n'appartenant pas aux groupes 7 ou 11.

<sup>8</sup> Afin de réduire le risque d'acquisition d'une résistance aux fongicides, utiliser le fongicide Forum en mélange avec d'autres fongicides. Ne pas faire plus de quatre applications par saison.

<sup>9</sup> Doit être utilisé en alternance avec d'autres fongicides offrant un mode d'action différent pour la lutte contre le mildiou.